



# GENİTAL ULCER PANELİ

Genital ulcer (xora, yara) bir neçə xəstəlik fonunda yarana bilər. Genital xoraya əsasən Treponema Pallidum (sifilis), Hemophilus durceyi (şankroid), Calymmobacterium granulomatis (granuloma inguinale), invasiv Chlamydia trachomatis (lymphogranuloma venerum). HSV1 və HSV2 (herpes), CMV (sitomeqalovirus), VZV (varisella zoster virus).

İNFEKSİON XƏSTƏLİK FONUNDA YARANAN YARALAR		
	Patogen mikroorganizm	Xüsusiyyətlər
<b>Sifilis (şankr)</b>	Treponema Pallidum İD: 9-90 gün	<b>Genital yara:</b> düyməyə bənzər papula hansiki agrısız eroziyaya çevirir, və daha sonra etrafi əhatələnmiş az miqdarda seroz eksudati olan yaraya çevirilir. Səhти adətən bərk olur. <b>Ağrı:</b> ağrısız (əgər S. palidumla konfeksiya deyilsə)
<b>Şankroid (yumuşaq şankr)</b>	Hemophilus Ducreyi İD: 4-7 gün	<b>Genital yara:</b> papula-eritromatoz oreola-pustula-eroziya-yara. <b>Ağrı:</b> ağrılı
<b>Limfoqranulyoma Venerum</b>	Chlamydia Trachomatis (serotip L) İD: 1-ci mərhələ 3-12 gün 2-ci mərhələ 10-30 gün	<b>Genital yara:</b> balaca, ağrısız papula və ya vezikula, hansı ki yaraya çevirir. Limfa vezileri boyuyur. Tək və ya qrup şəklində.
<b>Genital Herpes</b>	HSV-2 =90% hallarda HSV-1 10 % hallarda	<b>Genital yara:</b> eritramatoz sahələr-gruplaşmış vezikullar-pustulalar-eroziyalar-yaralar.
<b>CMV infeksiya</b>	Cytomegalovirus (CMV) İD: 20-60 gün	*
<b>Suçċəyi-Qurşaqlı Ucuq</b>	Varicella Zoster Vizrus (VZV, HHV-3) İD: 7-21 gün	**

\*Varisela Zoster virus infeksiyası (suċċəyi) eynən Herpes viruslardan olub, kliniki əlamətlər özünü eyni göstərə bilər (eritramatoz sahədə kümələnmiş vezikullar və ya yaralar). Ancaq varisella zosterin dermatomal dağılımına malik olması onu Herpes virus infeksiyasından fərqləndirir.

\*\*HSV yaraların əsl patogen amilli olsada, bəzi hallarda müayinələr zamanı genital yaraların törədicisi kimi CMV təyin edilə bilir

**Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, genital nahiyyədə yaralar geyri-infeksiyon fondada yarana bilər:**

- Travmatik ulcer (yara)
- Sabit narkotik püskürmələr
- Skabies (qotur)
- Pioqenik ulcer (yara)
- Malignant ulcer (yara)
- Bexçet ulceri (yara)

Xoralar (yaralar) bir birinə oxşar olduğu üçün yara törədicilərini bir birindən differinsasiya etmək olduqca çətinləşir.

**Qeyd edilən xəstəliklərin törədicilərini dəqiq və qısa zamanda təyin etmək üçün sizə "Genital Ulcer Paneli" ni təqdim edirik.**

✓ <b>Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)</b>
✓ <b>Herpes simplex virus type 2 (HSV-2)</b>
✓ <b>Varicella-zoster virus (VZV)</b>
✓ <b>Cytomegalovirus (CMV)</b>

✓ <b>Lymphogranuloma venereum</b>
(LGV, Chlamydia trachomatis Serovar L)
✓ <b>Treponema pallidum (TP)</b>
✓ <b>Haemophilus ducreyi (HD)</b>

## Material

- Genital yaxma (uretral, vaginal, servikal)
- Maye əsaslı sitoloji nümunə (məsələn, ThinPrep® və SurePath™)
- Sidik

Bu müayinə genital xoraların (yaraların) müalicəsi zamanı onun bacterial və ya virus mənşəli olmasından aslı olaraq dərman preparatlarının düzgün secimi üçün vacibdir. Effektiv nəticə ələdə etmək üçün multipleks PZR üsulundan istifadə edin!

