




## YALNIZ REFERANS LABORATORİYALARDA TƏYİN EDİLİR!

# “LAYM” XƏSTƏLİYİ

*Müasir dünya epidemiyası*



**BORRELİA BURGDORFERİ İNFEKSİYASI TƏRƏFİNDƏN TÖRƏDİLƏN, İXODES PACİFİCUS GƏNƏLƏRİ  
VƏ BAŞQA HƏŞƏRATLARIN DİŞLƏMƏSİ İLƏ KEÇƏN TRANSMİSSİV XƏSƏLİKDİR.**

## DAHA ÇOX RİSKƏ MƏRUZ QALAN POPULYASIYA

**YAŞAVİŞ YERLƏRİNDE, ÇÖLLƏRDƏ, MEŞƏDƏ AKTİV VAXT  
KEÇİRƏN VƏ GƏNƏLƏR TƏRƏFİNDƏN DİŞLƏNƏN İNSANLAR**



## XƏSTƏLİYİN SİMPТОMLARI

### 1-ci mərhələ (1-4 həftə)

- Yayılmış dəri səpgisi (Eritema migrans)
- “Bull eye” simptomu (öküz gözü)
- Qripəbənzər simptomlar (yüksek hərarət, üşütmə, baş ağrısı, əzələ ağrısı)
- Yaxın limfa düyünlərinin böyüməsi

### 2-ci mərhələ - erkən yayılmış infeksiya (1-4 ay)

- Üz əzələsində zəiflik və iflic
- Əzələlərdə, diz və başqa oynaqlarda ağrı və şişmə
- Taxikardiya, aritmija və s.

### 3-cü mərhələ, gec yayılmış mərhələ

- İlkin infeksiyadan 1 ay və ya 1 il sonra müşahidə olunur
- Əzələ və oynaq ağrıları (Carpal Tunel sindromu) əsas simptomlardır

## DİGƏR SİMPТОMLAR:

- Qeyri-normal əzələ hərəkətləri
- Əzələ zəifliyi
- Keylik və əsmə
- Nitq problemləri
- Üz iflici (Bells Palsy)
- Sərt və ağrılı boyun
- Göz ağrısı və gözətrafi şışmə

- İşığa həssaslıq
- Qulaq problemləri (ağrı, cingilti, səs və s.)
- Həzm və ifrazat sistemi problemləri (mədə ağrısı, qastorezofagial reflüks, qəbizlik, diareya və s.)
- Yaddaş pozğunluğu, əsəbilik, gərginlik
- Reproduksiyon və seksual pozğunluqlar və s.

## DIAQNOSTİKASI

### Qan analizi: ELISA testi

Neqativ ELISA → LAYM xəstəliyi yoxdur

Pozitiv ELISA → Western Blot

Pozitiv Western Blot → LAYM xəstəliyi var

PZR-Bb DNT

Biopsiya






\*0033

ÇAĞRI  
MƏRKƏZİ





## TƏSDİQLƏYİCİ TESTLƏR



*Osp (outer surface protein)- xarici səthi protein (Osp) - protektiv fəallığa malikdir, adheziyanı təmin edir*

## MÜALİCƏSİ

- **ANTİBİOTİKOTERAPİYA**
- Erkən simptomlar üçün 14-21 gün ərzində antibiotikoterapiya ilə müsbət nəticələr əldə olunur.
- **Doxycycline** - böyükłər və 8 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün;
- **Cefuroxime** və **Amoxicillin** - böyükłər, uşaqlar və süd əmizdirən analar üçün.

## GƏNƏ İLƏ KEÇƏN DİĞƏR TÖRƏDİCİLƏR

Anaplasma phagocytophilum	Qranulasitar erlixioz
Borrelia burgdorferi	Laym xəstəliyi
Borrelia garinii	Laym xəstəliyi
Borrelia afzeii	Laym xəstəliyi
Borrelia digər növləri	Endemik residivləşən qızdırma
Coxiella burnetti	Q-qızdırması
Ehrlichia chaffeensis	Monositar erlixioz
Ehrlichia ewingii	"Canine" qranulasitar erlixioz
Francisella tularensis	Tulyaremiya
Rickettsia rickettsii	Səpgili yatalaq
Arboviruses (Flaviviruses)	Ensefalit
Reovir	Kolorado gənə qızdırması

